

ŽVIRBLINIAI: audėjiniai, kikiriniai, startiniai

Žvirbliai lengvai pastebimi ir perėjimo statusą nesunku nustatyti.

Dauguma kikirinių nedidelius lizdus krauna aukštai medžiuose, todėl juos sunku aptikti. Perėjimo statusą geriausia nustatyti iš balso ir sekant paukščius. Efektyviausias laikas – gegužės mėnuo.

Startinių perėjimo statusą paprasčiausia nustatyti iš giedančių patinų. Patinai mėgsta giedoti tupėdami krūmų, neaukštų medelių viršūtinėje dalyje ar viršūnėje, geltonoji bei pilkoji ir ant laidų.

Išskyrus kryžiasnapius, visų rūšių efektyviausias laikas perėjimo statusui nustatyti – gegužės mėnuo. Aktyvumo pikas skirtinguose regionuose gali nežymiai skirtis. Visų rūšių vokalizacinis aktyvumo pikas yra per saulėtąjį ir keturios valandos po jo. Po pietų paukščių vokalizacinis aktyvumas minimalus. Dauguma rūšių nesunkiai pastebimos ir vizualiai.

Pavadinimas	Kur ieškoti?	Tipinis balsas	Specifiniai veisimosi požymiai, kitos pastabos
Audėjiniai <i>Passeridae</i>			
Naminis žvirblis <i>Passer domesticus</i>	Laikosi žmogaus kaimynystėje. Gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Gausus gyvulių fermų, grūdų sandėlių, malūnų teritorijose. Dažni dideliuose miestuose, miestų parkuose, skveruose, vienkiemiu želdiniuose.	http://www.xeno-canto.org/species/Passer-domesticus	Peri kovo - liepos mėn., išveda 2-3 vadas. Lizdas gali būti uokse, inkile, įvairių statinių nišoje, gandrakizdyje.
Karklažvirblis <i>Passer montanus</i>	Gyvenvietės, kaimo tipo kraštovaizdis su pavienėmis sodybomis, ūkiais, taip pat ir miestai – ypač jų pakraščiai. Svarbu, kad būtų tinkamų matmenų uoksu, drevių, inkilų ar kitokių tinkamų lizdai vietų.	http://www.xeno-canto.org/species/Passer-montanus	Peri gegužės - birželio mėn., išveda 2-3 vadas. Lizdas gali būti uokse, inkile, įvairių statinių nišoje gandrakizdyje.
Kikiriniai <i>Fringillidae</i>			
Paprastasis kikirilis <i>Fringilla coelebs</i>	Miškai, sodai, laukų ir vandens telkinių apsauginiai želdiniai, miestų ir gyvenviečių želdiniai, miško parkai, skverai, kapinės ir visur, kur yra medžių bei krūmų, o ypač eglių.	http://www.xeno-canto.org/species/Fringilla-coelebs	Peri balandžio - birželio mėn., išveda 2 vadas. Lizdas įvairių rūšių medžiuose ir krūmuose.
Šiaurinis kikirilis <i>Fringilla montifringilla</i>	Spygliuočių, mišrūs bei lapuočių miškai.	http://www.xeno-canto.org/species/Fringilla-montifringilla	Peri balandžio - gegužės mėn. Lizdas įvairių rūšių medžiuose ir krūmuose. Lietuvoje perėjimas atsitiktinio pobūdžio.

Svilikėlis <i>Serinus serinus</i>	Skverai, parkai, kapinės, medelynai. Labiau renkasi mišrius želdinius su pavienėmis pušimis, eglėmis, kėniais, pocūgėmis, maumedžiais bei tujomis. Kartais įsikuria tarp vinvyčių, vynuogių, sausmedžių.	http://www.xeno-canto.org/species/Serinus-serinus	Peri gegužės – birželio mėn., išveda 2 vadas. Lizdas įvairiuose medžiuose. Gieda medžių viršūnėse, kartais ant namo antenų.
Žaliukė <i>Carduelis chloris</i>	Šalia nedidelių miškelių, miško pakraščiai, sodų apsauginiai želdiniai, parkai, sodybos, medelynai, kapinės, gyvenvietės bei miestuose, kur auga eglės, tujos, pocūgės ir kėniai.	http://www.xeno-canto.org/species/Chloris-chloris	Peri balandžio - gegužės mėnesiais, išveda 2 vadas. Lizdas įvairiuose medžiuose.
Dagilis <i>Carduelis carduelis</i>	Miško pakraščiai, laukų miškeliai, grioviai, skardžiai, upių, tvenkinių pakrančių želdiniai, parkai, miestų, gyvenviečių, sodybų, pakelių ir geležinkelių apsauginiai želdiniai, kapinės. Kartais miško pakraščiuose. Nesirenka grynų pušynų, tankių baltalksnynų, eglynų.	http://www.xeno-canto.org/species/Carduelis-carduelis	Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas įvairiuose medžiuose.
Alksninukas <i>Carduelis spinus</i>	Mišrūs eglų-lapuočių medynai, mišrūs pušynai, ypač ten, kur greta auga beržai. Pamiškės, paežerės, upių pakrantės bei laukų želdiniai. Miestų parkai, kuriuose auga tujos, maumedžiai bei kiti spygliuočiai.	http://www.xeno-canto.org/species/Spinus-spinus	Peri balandžio - birželio mėn. (2 vados). Lizdas įvairiuose medžiuose (dažniausiai eglėse), sunkiai randamas.
Paprastasis čivylis <i>Carduelis cannabina</i>	Biotopo atžvilgiu neišrankus. Labiau renkasi 10-30 metų amžiaus spygliuočių, tankių lapuočių sąžalynus, karpomas apsaugines juostas.	http://www.xeno-canto.org/species/Linaria-cannabina	Peri balandžio - liepos mėn. (2 vados). Lizdas įvairiuose medžiuose, krūmuose, lianose.
Geltonsnapis čivylis <i>Carduelis flavirostris</i>	Akmenuotos, retais krūmokšniais bei skurdžia augalija apaugusios dykvietės, jūrų salos ir pakrantės.	http://www.xeno-canto.org/species/Linaria-flavirostris	Lizdas medžiuose. Lietuvoje peri atsitiktinai.
Eglinis kryžiasnapis <i>Loxia curvirostra</i>	Brandūs, perbrendę bei vidutinio amžiaus eglynai. Eglės ir lapuočių medynai, maumedynai, pajūrio kalninės ir paprastosios pušies miškai, parkai, botanikos sodai, mišrūs pušynai – ten kur yra derančių spygliuočių.	http://www.xeno-canto.org/species/Loxia-curvirostra	Peri vasario - balandžio mėn. Lizdas dažniausiai eglėje, sunkiai aptinkamas. Laikosi spygliuočių viršūnėse, todėl vizualiai sunkiai susekamas. Gali nusileisti ant žemės atsigerti. Kartais paukščius išduoda krentantys konkorėžiai.

Pušinis kryžiasnapis <i>Loxia pytyopsittacus</i>	Eglių, pušų arba mišrūs spygliuočių-lapuočių sausi medynai. Lizdai eglėse, pušyse.	http://www.xeno-canto.org/species/Loxia-pytyopsittacus	Peri kovo-balandžio mėn. Lietuvoje lizdas nerastas. Perėjimas daugiau atsitiktinio pobūdžio. Laikosi spygliuočių viršūnėse, todėl vizualiai sunkiai susekamas. Kartais paukščius išduoda krentantys konkorėžiai.
Raudongalvė sniegena <i>Carpodacus erythrinus</i>	Upių, ežerų, tvenkinių pakrančių želdiniai, krūmotos pievos, miško pakraščiai, šlapios kirtavietės su atželiančiais jaunuolynais.	http://www.xeno-canto.org/species/Carpodacus-erythrinus	Peri birželio mėn. Lizdas žemai krūmuose, avietynuose, žolių stagarynuose.
Juodagalvė sniegena <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Miškai, sodai, parkai, miestai. Mišrūs lapuočių medynai su eglės priemaiša, mišrūs pušynai su egle. Retesnė pušnyuose, ypač grynuose, kerpiniuose ir be jokio trako bei pomiškio.	http://www.xeno-canto.org/species/Pyrrhula-pyrrhula	Peri gegužės - birželio mėn. (2 vados). Lizdas įvairiuose medžiuose, ypač eglėse.
Svilikas <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Mišrūs eglių-lapuočių, lapuočių miškai, sodybos su senais lapuočiais, sodų apsauginės juostos, miestų, gyvenviečių, šlaitų, griovių želdiniai. Renkasi brandžius ir bręstančius medynus, kuriuose vyrauja plačialapiai lapuočiai medžiai: ąžuolai, skroblai, liepos, klevai. Vengia grynų, tankių eglynų, bei stambių miško masyvų.	http://www.xeno-canto.org/species/Coccothraustes-coccothraustes	Peri gegužės mėn. Lizdas įvairiuose medžiuose.
Startiniai <i>Emberizidae</i>			
Geltonoji starta <i>Emberiza citrinella</i>	Laukų, pakelių želdiniai, pamiškės, plynos kirtavietės. Renkasi sausesnes vietas. Nedideli pušynai, melioracijos griovių išraižyta vieta. Priemiesčių parkai, reti želdiniai. Pelkėtose vietose visai neperi.	http://www.xeno-canto.org/species/Emberiza-citrinella	Peri gegužės - birželio mėn. (2 vados). Lizdas ant žemės, rečiau neaukštai sumedėjusioje augalijoje.
Sodinė starta <i>Emberiza hortulana</i>	Sausos pušynų pamiškės, nedideli laukų gojeliai, Kartais sodų pakraščiuose. Nevengia pavienių kaimo sodybų.	http://www.xeno-canto.org/species/Emberiza-hortulana	Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas ant žemės. Veisimosi metu ypatingai mėgsta medžių juostas, alėjas, pakelių želdinius supamus dirbamų laukų ir pievų.
Nendrinė starta <i>Emberiza schoeniclus</i>	Šlapios krūmotos pievos, įvairaus pločio užpelkėjusių vandens telkinių pakraščiai, įvairaus dydžio tankia žoline ar reta sumedėjusia augalija apaugusios pelkutės, žemapelkės, durpynai.	http://www.xeno-canto.org/species/Emberiza-schoeniclus	Peri balandžio - birželio mėn. (2 vados). Lizdas viršvandenėje augalijoje, ant žemės, žolėse, kartais toli nuo vandens.

Pilkoji starta <i>Emberiza calandra</i>	Drėgni derlingi laukai, kuriuose auga pavieniai medžiai, krūmai arba yra telefono bei elektros stulpų. Vengia miškingų, labai drėgnų bei atvirų plotų.	http://www.xeno-canto.org/species/Emberiza-calandra	Peri gegužės - birželio mėn. (galimos 2 vados). Lizdas ant žemės.
--	--	---	---

Kalendorius

T	Užima teritoriją, pradeda giesmę, tuoktuves
P	Deda kiaušinius, peri
L	Jaunikliai lizde
J	Jaunikliai neskraido / laikosi netoli lizdo, tėvai maitina jauniklius

Lietuviškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis
Audėjiniai	Passeridae								
Naminis žvirblis	<i>Passer domesticus</i>		T T T P P	P P P L L	P P P P L	L L P P P P L L			
Karklažvirblis	<i>Passer montanus</i>	T T T T T T	T T T T	T T T P	P P P P L	L L P P L L			
Kikiliniai	Fringillidae								
Paprastasis kikilis	<i>Fringilla coelebs</i>		T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L			
Šiaurinis kikilis	<i>Fringilla montifringilla</i>		T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L			
Svilikėlis	<i>Serinus serinus</i>		T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L			
Žaliukė	<i>Carduelis chloris</i>		T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L			
Dagilis	<i>Carduelis carduelis</i>		T T T T	T T T T	P P P P L	L L L L L L L L			
Alksninukas	<i>Carduelis spinus</i>	T T T T	T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L			
Paprastasis čivylis	<i>Carduelis cannabina</i>		T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L			
Geltonsnapis čivylis	<i>Carduelis flavirostris</i>		T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L			
Eglinis kryžiasnapis	<i>Loxia curvirostra</i>	T T T T	T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L			
Pušinis kryžiasnapis	<i>Loxia pytyopsittacus</i>		T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L			
Raudongalvė sniegena	<i>Carpodacus erythrinus</i>				T T T T	P P P P L L			
Juodagalvė sniegena	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	T T T T T T	T T T T T T	T T T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L		
Svilikas	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>		T T T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L			
Startiniai	Emberizidae								
Geltonoji starta	<i>Emberiza citrinella</i>		T T T T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L	L L L L L L L L	J	
Sodinė starta	<i>Emberiza hortulana</i>			T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L	J	
Nendrinė starta	<i>Emberiza schoeniclus</i>		T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L	L L L L L L L L		
Pilkoji starta	<i>Emberiza calandra</i>			T T T T T T	P P P P L	L L L L L L L L	L L L L L L L L		