

## Geniniai paukščiai

Geniniai yra aktyvūs šviesiu paros metu. Dažniausiai aptinkami balsų pagalba. Nuo kitų paukščių grupių išsiskiria tuo, kad patys kala uoksus. Nuo kovo pradžios iki balandžio pabaigos girdimi genių tarškinimai, balsiniai šūkavimai. Paieškoms geriausi šilti rytai, pirmos 3 valandos po saulės patekėjimo. Skirtingos rūšys užima skirtingo tipo miškus, senus parkus, visur kur gausu senų medžių. Paieškoms geriausias laikotarpis kovo – balandžio mėnesiai, vėliau birželio mėn., kuomet lizduose būna jaunikliai, jie labai triukšmingi, o tėvai aktyviai juos maitina. Gražiagalvės aktyviausios gegužės – birželio mėn.

Pavadinimas	Kur ieškoti?	Tipinis balsas	Specifiniai veisimosi požymiai, kitos pastabos
Gražiagalvė <i>Jynx torquilla</i>	Įvairaus dydžio lapuočių ir mišrūs miškai, dažniausiai jų pakraščiai, taip pat seni sodai, parkai, kitokie želdiniai. Dažnesnė natūralių pievų ir ganyklų pakraščiuose, prie šlaitų.	<a href="http://www.xeno-canto.org/species/Jynx-torquilla">http://www.xeno-canto.org/species/Jynx-torquilla</a>	Lietuvoje paplitusi rūšis, sutinkama visoje šalies teritorijoje. Tai migruojanti paukščių rūšis, kuri sugrįžta atšilus orams, balandžio antroje pusėje. Aktyvi diena ir nesunkiai aptinkama pagal balsą. Peri uoksuose, noriai užima inkilus, kuomet nesunkiai pastebima, kai neša maistą jaunikliams.
Pilkoji meleta <i>Picus canus</i>	Lapuočių ir mišrūs miškai, mėgsta (šlapesnius) miškus ar jų dalis.	<a href="http://www.xeno-canto.org/species/Picus-canus">http://www.xeno-canto.org/species/Picus-canus</a>	Apyretė rūšis. Aktyvi pavasarį, dažnai aptinkami šaukiantys paukščiai. Įsikuria šlapesniuose miškuose, ar pelkių pakraščiuose.
Žalioji meleta <i>Picus viridis</i>	Spygliuočių miškai, ypač jų pakraščiai prie vandens, pamiškėse, nevengia pušynais apsuptų kaimų. Tačiau mielai įsikuria ir paupių šlaitų miškuose. Rečiau aptinkama mišriuose miškuose.	<a href="http://www.xeno-canto.org/species/Picus-viridis">http://www.xeno-canto.org/species/Picus-viridis</a>	Apyretė rūšis. Aktyvi pavasarį, dažnai aptinkami šaukiantys paukščiai. Įsikuria sausesnių miškų pakraščiuose, kirtavietėse, nevengia urbanistinių teritorijų, parkų.
Juodoji meleta <i>Dryocopus martius</i>	Aptinkama įvairaus tipo miškuose, kuriuose yra senų medžių.	<a href="http://www.xeno-canto.org/species/Dryocopus-martius">http://www.xeno-canto.org/species/Dryocopus-martius</a>	Įprasta rūšis miškuose. Aktyvi pavasarį, dažnai girdimi šaukiantys paukščiai.
Didysis margasis genys <i>Dendrocopos major</i>	Aptinkama įvairaus tipo miškuose, parkuose, didesniuose soduose, medžių alėjose.	<a href="http://www.xeno-canto.org/species/Dendrocopos-major">http://www.xeno-canto.org/species/Dendrocopos-major</a>	Labai dažna rūšis, užima įvairius biotopus. Aktyvi pavasarį, dažnai girdimas kalenimas, šaukiamasis balsas. Gegužės pabaigoje miške lengva aptikti uokse šaukiančius jauniklius.
Sirinis genys <i>Dendrocopos syriacus</i>	Urbanistinės teritorijos, medžių alėjos, seni sodai, parkai, kapinės, taip pat agrarinio kraštovaizdžio želdiniai.	<a href="http://www.xeno-canto.org/species/Dendrocopos-syriacus">http://www.xeno-canto.org/species/Dendrocopos-syriacus</a>	Vieną kartą fiksuota rūšis Lietuvoje, gretimose šalyse peri šalia Lietuvos sienos. Rūšis ieškotina prie lapuočių - tuopos, uosiai, drebulės, obelys. Didesnė tikimybė aptikti pietryčių ir pietų Lietuvos dalyse.
Vidutinis margasis genys <i>Dendrocopos medius</i>	Miškai su ąžuolu, lapuočių miškai, mišrūs miškai, parkai.	<a href="http://www.xeno-canto.org/species/Dendrocopos-medijs">http://www.xeno-canto.org/species/Dendrocopos-medijs</a>	Miškuose su ąžuolu yra įprasta rūšis, mišriuose miškuose apyretė. Neaptinkama grynuose pušnyuose, retesnė rytų, vakarų Lietuvoje. Kovo balandžio mėnesiais girdimas šaukiamasis balsas.

Mažasis margasis genys <i>Dendrocopos minor</i>	Lapuočių ir mišrūs medynai, želdiniai prie vandens telkinių, didesni parkai. Reikalingi minkštieji lapuočiai – baltalksniai, tuopos, blindės, drebulės, beržai.	<a href="http://www.xeno-canto.org/species/Dendrocopos-minor">http://www.xeno-canto.org/species/Dendrocopos-minor</a>	Įprasta rūšis. Paprastai gausesnė vandens telkinių pakraščiuose prie juodalksnynų. Vengia sausų pušynų. Kovo pabaigoje, balandžio mėnesį girdimas šaukiamasis balsas.
Baltnugaris genys <i>Dendrocopos leucotos</i>	Lapuočių ir mišrūs miškai, paprastai drėgnesnės vietos kur yra daug stuobrių ir trūnijančios medienos. Būtni minkštųjų medžių rūšių – alksnių, beržų, drebulių, medynai.	<a href="http://www.xeno-canto.org/species/Dendrocopos-leucotos">http://www.xeno-canto.org/species/Dendrocopos-leucotos</a>	Reta rūšis. Aptinkama didesniuose miškuose kur gausu negyvos medienos. Vengia sausų pušynų. Kovo – balandžio mėnesiais girdimas genių kalenimas, šaukiamasis balsas.
Tripirštis genys <i>Picoides tridactylus</i>	Borealinio (taigos) tipo miškų paukštis. Dažniausia aptinkamas eglynuose ar miškuose su žymia eglės priemaiša.	<a href="http://www.xeno-canto.org/species/Picoides-tridactylus">http://www.xeno-canto.org/species/Picoides-tridactylus</a>	Reta rūšis, aptinkama didesniuose miško masyvuose, prie pelkių kur daugiau negyvos medienos, ypač mėgsta medynus su eglės priemaiša. Kovo – balandžio mėnesiais girdimas tarškinimas ir balsinis šaukimas.

## Kalendorius

Kalendorius tik apytiksliai nusako veisimosi periodus ir gali svyruoti priklausomai nuo sezono eigos ir regiono.

- T Užima teritoriją, pradeda giesmę, tuoktuves
- P Deda kiaušinius, peri
- L Jaunikliai lizde
- J Jaunikliai neskraido / laikosi netoli lizdo, tėvai maitina jauniklius

Lietuviškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis
<b>GENINIAI</b>	<b>PICIFORMES</b>								
	<b>Picidae</b>								
Gražiagalvė	<i>Jynx torquilla</i>					P P P	L L L		
Pilkoji meleta	<i>Picus canus</i>		T T T T	T T T T	T P P P	L L L L			
Žalioji meleta	<i>Picus viridis</i>	T T T T	T T T T	T T T T	T T T T	P P P L	L L L L		
Juodoji meleta	<i>Dryocopus martius</i>	T T T T	T T T T	P P P P	L L L L				
Didysis margasis genys	<i>Dendrocopos major</i>		T T T T	P P L L					
Sirinis genys	<i>Dendrocopos syriacus</i>		T T T T	P P L L					
Vidutinis margasis genys	<i>Dendrocopos medius</i>		T T T	P P P L	L				
Mažasis margasis genys	<i>Dendrocopos minor</i>		T T T T	T T T T	T P P P	L L L L	J J		
Baltnugaris genys	<i>Dendrocopos leucotos</i>	T	T T T T	T T	P P P L	L L L L			
Tripirštis genys	<i>Picoides tridactylus</i>		T T T T	T T T	P P P L	L L L L	J J J J		