

ŽVIRBLINIAI (1)

Vieversiniai, kregždiniai, kieliniai, karietainiai, erškėtžvirbliniai

Efektviausias laikas visoms rūšims gegužės - birželio mėn. Aktyvumo pikas skirtinguose regionuose gali nežymiai skirtis. Visų rūšių vokalizacinis aktyvumo pikas yra per saulėtekį ir keturios valandos po jo. Po pietų paukščių vokalizacinis aktyvumas minimalus. Daugeliu atvejų paukščiai lengviausiai aptinkami iš balsų (išskyrus kregždes, taip pat kieleles, kurios lengvai pastebimos), o toliau pagal balsą jau galima paukščio ieškoti vizualiai. Jei paukščiai stebimi jauniklių auginimo metu (balandžio pab. - liepos mėn.), verta juos sekti ir nustatyti, ar neša maistą jaunikliams. Išgirdus ir/ar pamačius paukštį tinkamoje buveinėje pakartotinai (ne tik toje pačioje vietoje, bet visame kvadrato) tvirtina B perėjimo statusą (tikėtinas perėjimas). Lengviausiai pastebimas ir nereikalaujantis lizdo paieškos perėjimo (C statusas) požymis yra suaugęs paukštis su maistu snape.

Vieversiniai lengviausiai aptinkami iš balsų (pikas balandis - gegužės vid.).

Kregždiniai lengvai pastebimi, gyvena žmogau kaimynystėje. Birželio- liepos mėn. visus paukščius galima priskirti vienam ar kitam perėjimo statusui.

Kalviukus lengviausia iš balsų ne tik aptikti, bet ir atpažinti. Vokalizacinio aktyvumo pikas balandžio - gegužės mėn.

Kielės lengvai pastebimos. Perėjimo statusą lengviausia nustatyti iš elgsenos šalia lizdo su jaunikliais nuo gegužės vid.

Karietaitės nesunkiai pastebimos įvairių tipų miškuose ir želdiniuose.

Erškėtžvirblį lengviausia aptikti iš balso rytinėmis valandomis.

Rūšies pavadinimas	Kur ieškoti?	Tipinis balsas	Specifiniai veisimosi požymiai
Vieversiniai <i>Alaudidae</i>			
Kuoduotasis vieversys <i>Galerida cristata</i>	Veisimosi periodu iš dalies urbanizuotas landšaftas. Laikosi atviruose plotuose - gazonai, sankryžos.	http://www.xeno-canto.org/species/Galerida-cristata	Aktyvus tik šviesiuoju paros metu. Peri balandžio - birželio mėn. (2 vados). Lietuvoje nerastas nuo XX a. I pusės. Laikosi dažniausiai ant žemės ir neuštų pakilimų.
Lygutė <i>Lullula arborea</i>	Sausas miškingas landšaftas. Lengva, gerai drenuota dirva, kirtavietės, pamiškės.	http://www.xeno-canto.org/species/Lullula-arborea	Aktyvi dieną ir prietemoje. Peri balandžio - birželio mėn. Lizdas ant žemės, sunkiai aptinkamas.
Dirvinis vieversys <i>Alauda arvensis</i>	Sausos ir vidutinio šlapumo pievos, aukštapelkės, pusiau natūralūs dirvonai, dykvietės, dirbami laukai.	http://www.xeno-canto.org/species/Alauda-arvensis	Aktyvus šviesiuoju paros metu, iš dalies ir prietemoje. Peri birželio - liepos mėn. (2-3 vados). Lizdas ant žemės.
Kregždiniai <i>Hirundinidae</i>			
Urvinė kregždė <i>Riparia riparia</i>	Statūs upių krantai, žvyro bei smėlio karjerai.	http://www.xeno-canto.org/species/Riparia-riparia	Peri kolonijomis, birželio - rugpjūčio mėn. (2 vados). Lizdai urvuose lengvai pastebimi.
Šelmeninė kregždė <i>Hirundo rustica</i>	Įsikuria gyvenvietėse, dažniau kaimuose.	http://www.xeno-canto.org/species/Hirundo-rustica	Peri gegužės - rugpjūčio mėn. (2-3 vados). Atviras lizdas įvairiuose žmogaus statiniuose ar po jais.

Langinė kregždė <i>Delichon urbicum</i>	Peri gyvenvietėse, lizdus suka mūriniuose pastatuose.	http://www.xeno-canto.org/species/Delichon-urbicum	Peri birželio - liepos mėn. dažniausiai nedidelėmis kolonijomis (2 vados). Uždaras lizdas įvairiuose žmogaus statiniuose ar po jais.
Kieliniai Motacillidae			
Dirvoninis kalviukas <i>Anthus campestris</i>	Smėlingos, žvyringos dykvietės. Retkarčiais pastebimas priemolių sausuose dirvonuose, iškastų durpynų plynėse, degimuose.	http://www.xeno-canto.org/explore?query=Anthus+campestris	Lizdas ant žemės. Peri gegužės - birželio mėn. Teritoriniai paukščiai giedodami tupia ant laidų, stulpų, kitų pakilumų. Ant jų dažnai ilsisi ar nutupia su maistu prieš leisdamiesi į lizdą.
Miškinis kalviukas <i>Anthus trivialis</i>	Peri spygliuočių ir lapuočių miškuose. Dažnas mėlyniniuose pušynuose.	http://www.xeno-canto.org/explore?query=Anthus+trivialis	Aktyvus dieną. Peri gegužės - liepos mėn. (2 vados). Lizdas ant žemės, sunkiai aptinkamas ir susekamas. Lengviausia nustatyti veisimosi statusą iš nerimaujančių paukščių prie lizdo.
Pievinis kalviukas <i>Anthus pratensis</i>	Plačios kupstuotos pievos, pliki raistai. Rečiau pakelės ir griovių pašlaitės, tarp arimų išlikę akmenynai, ilgiau neišdžiūstantys dumblingi palomiai.	http://www.xeno-canto.org/explore?query=Anthus+pratensis	Aktyvus dieną. Peri gegužės - birželio mėn. (2 vados). Lizdas ant žemės. Ant laidų, stulpų, kitų pakilumų dažnai ilsisi ar nutupia su maistu prieš leisdamiesi į lizdą.
Geltonoji kielė <i>Motacilla flava</i>	Lietuvos didžiųjų upių lankos, nusausintų laukų lygumų žolėtos pakrantės ir pagrioviai, nešienaujami akmeningi plotai. Perėti įsikuria paraisčių kupstynuose, prie ežerėlių. Laikosi netoli vandens.	http://www.xeno-canto.org/explore?query=Motacilla+flava	Aktyvi dieną. Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas ant žemės. Šalia lizdo su jaunikliais esant žmogui, nerimaudama tupia (dažnai ir su maistu snape) į krūmų viršūnes ar ant aukštesnių žolių.
Geltongalvė kielė <i>Motacilla citreola</i>	Pelkėtas biotopas. Nendrėmis apaugusios aukštapelkių plynės, užpelkėjusios, žemais krūmais apaugusios viksvinės pievos.	http://www.xeno-canto.org/explore?query=Motacilla+citreola	Aktyvi dieną. Peri gegužės - birželio mėn. Lizdas ant žemės. Šalia lizdo su jaunikliais esant žmogui, nerimaudama tupia (dažnai ir su maistu snape) į krūmų viršūnes ar ant aukštesnių žolių.
Baltoji kielė <i>Motacilla alba</i>	Kaimo sodybos, gyvenvietės, lentpjūvės, medienos sandėliai, durpynai, miestų aikštelės.	http://www.xeno-canto.org/explore?query=Motacilla+alba	Aktyvi tik dieną. Peri balandžio - liepos mėn. (2 vados). Lizdas dažniausiai įvairiuose žmogaus statiniuose. Jei pastoviai laikosi ant to paties pastato, greičiausiai jame lizdas.
Karietainiai Troglodytidae			
Karietaitė <i>Troglodytes troglodytes</i>	Drėgni lapuočių miškai arba eglynai, seni medynai su išvirtusiais medžiais ir tankiu pomiškiu. Krūmuose arti upelių, užaugusiose griovose. Dažna soduose, kuriuose daug tankių želdinių - vaiskrūmių, avietynų, gyvatvorių.	http://www.xeno-canto.org/species/Troglodytes-troglodytes	Aktyvi šviesiuoju paros metu ir prieblandoje. Peri gegužės - birželio mėn. (2 vados). Lizdas šakų krūvose, raizgalynėse, jaunose eglaitėse, uždaras, rutulio formos. Suka kelis lizdus, bet peri tik viename.

Erškėtžvirbliniai Prunellidae

Erškėtžvirbliniai <i>Prunella modularis</i>	Nevienodo tankumo lapuočių ir spygliuočių plotai su tankiu pomiškiu. Paupiai, šlapios pievos, raistų žemi brūzgynai, sausi šilai.	http://www.xeno-canto.org/explore?query=prunella+modularis	Aktyvus dieną. Peri gegužės-birželio mėn. (2 vados). Lizdas dažnai neaukštai jaunose eglaitėse. Sunkiai aptinkamas, bet kartais atsitiktinai dažniau randamas lizdas su žydrais kiaušiniai nei pamatomas paukštis.
--	---	---	--

Kalendorius

Lietuviškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	<table border="0"> <tr> <td>T</td><td>Užima teritoriją, pradeda giesmę, tuoktuves</td> </tr> <tr> <td>P</td><td>Deda kiaušinius, peri</td> </tr> <tr> <td>L</td><td>Jaunikliai lizde</td> </tr> <tr> <td>J</td><td>Jaunikliai neskraido / laikosi netoli lizdo, tėvai maitina jauniklius</td> </tr> <tr> <td>?</td><td>Nėra duomenų</td> </tr> </table>								T	Užima teritoriją, pradeda giesmę, tuoktuves	P	Deda kiaušinius, peri	L	Jaunikliai lizde	J	Jaunikliai neskraido / laikosi netoli lizdo, tėvai maitina jauniklius	?	Nėra duomenų
		T	Užima teritoriją, pradeda giesmę, tuoktuves																
P	Deda kiaušinius, peri																		
L	Jaunikliai lizde																		
J	Jaunikliai neskraido / laikosi netoli lizdo, tėvai maitina jauniklius																		
?	Nėra duomenų																		
		Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis											
ŽVIRBLINIAI	PASSERIFORMES																		
Viewersiniai	Alaudidae																		
Kuoduotasis vieversys	Galerida cristata		? ?	? ? ? ?	? ? ? ?	? ? ? ? ?	? ? ? ? ?												
Lygutė	Lullula arborea			T T T	P P P P	L L L L L L	L L												
Dirvinis vieversys	Alauda arvensis		T T T T	P P L	L P P L	L P P L L	L												
Kregždiniai	Hirundinidae																		
Urvinė kregždė	Riparia riparia				T T T T	P P P P P P	L L L L L	P P L L L											
Šelmeninė kregždė	Hirundo rustica			T T T T	P P P P P P	L L L L L	P P L L L L	L L L L											
Langinė kregždė	Delichon urbicum				T T T T	P P P L	L L L L L	P P L L L L											
Kieliniai	Motacillidae																		
Dirvoninis kalviukas	Anthus campestris				T P P P	L L L L													
Miškinis kalviukas	Anthus trivialis			T P P P P	L L L L L L	L L L L L													
Pievinis kalviukas	Anthus pratensis			T P P P P	L L L L L L	L L L L L													
Geltonoji kielė	Motacilla flava			T P P P P	L L L L L L	L L L L L													
Geltongalvė kielė	Motacilla citreola			T P P P P	L L L L														
Baltoji kielė	Motacilla alba			T P P P L L L	L L L L L	P P L L	P P L L												
Karietaitiniai	Troglodytidae																		
Karietaitė	Troglodytes troglodytes			T T T P	P P P L L L	L L L L L L	L L												
Erškėtžvirbliniai	Prunellidae																		
Paprastasis erškėtžvirblis	Prunella modularis				T P P P L L	L P P L L L	L L												